

Diastasis Académie 8 mars 2023 résumé.

Diastasis recti : de quoi parle-t-on en 2023 ?

Ph.Ngo, JP. Cossa, S. Gueroult, H. Johanet, E. Pélissier.
Institut de la Hernie Paris

Le Diastasis Recti (DR) est un élargissement de la ligne blanche supérieure à 20mm et il est utile d'en préciser sa largeur sur un malade couché au repos et à l'effort, jambes tendues, les talons décollés de la table. De nombreux signes fonctionnels lui sont rattachés, notamment une instabilité musculaire et une atteinte de l'image corporelle, le DR peut être à l'origine d'une voussure abdominale médiane à l'effort en position couché mais également d'une distension globale de l'abdomen en position debout.

L'examen clinique est généralement suffisant en pratique courante, l'imagerie n'est pas indispensable mais permet d'objectiver des lésions associées.

Le traitement chirurgical consiste toujours en une suture aponévrotique éventuellement associée à une prothèse, par laparotomie ou endoscopie. En cas de hernie ventrale associée, le DR augmente le risque de récurrence de la hernie.

Tous ces éléments doivent être pris en compte dans la décision chirurgicale.

Mots clefs : diastasis recti, hernie ventrale, chirurgie endoscopique

Diastasis Recti: what is it about in 2023?

Ph. Ngo, JP. Cossa, S. Gueroult, H. Johanet, E. Pélissier
Institut de la Hernie Paris.

Diastasis recti (DR) is defined as enlargement of the linea alba superior to 20mm. The inter-rectus distance is measured on the patient resting and at leg-raise. DR may induce different symptoms, such as core instability and body image impairment. It can provoke medial bulging, which is well visible on the patient lying at leg-raise as well as global abdominal distension which is visible on the patient standing at rest.

In current practice physical examination is generally sufficient; imaging is not indispensable but it can visualize other inapparent diseases.

The surgical treatment does always involve approximation of both rectus muscles by suture, that can also be combined with patch repair and that can be performed by open or endoscopic access.

In case of ventral hernia and concomitant DR, the risk of hernia recurrence is increased. These data should be taken in consideration for surgical indication.

Key Words: Diastasis Recti, Ventral hernia, Endoscopic surgery

Nom du document : resume academie 2023 PN - NGO.docx
Dossier : /Users/pascalbouret/Library/Containers/com.microsoft.Word/Data/Documents
Modèle : /Users/pascalbouret/Library/Group Containers/UBF8T346G9.Office/UserContent.localized/Templates.localized/Normal.dotm
Titre :
Sujet :
Auteur : Microsoft Office User
Mots clés :
Commentaires :
Date de création : 08/03/2023 13:02
N° de révision : 2
Dernier enregistr. le : 08/03/2023 13:02
Dernier enregistrement par : Utilisateur de Microsoft Office
Temps total d'édition : 0 Minutes
Dernière impression sur : 08/03/2023 13:02
Tel qu'à la dernière impression
Nombre de pages : 1
Nombre de mots : 359 (approx.)
Nombre de caractères : 1 976 (approx.)