

---

## Intervention de Hartmann pour diverticulite compliquée : à partir d'une étude prospective réalisée par l'Association Française de Chirurgie (2003)

---

G. MANTION, Y. PANIS, K. SLIM

Correspondance :  
G MANTION  
Service de chirurgie digestive  
CHU de Besançon  
Hôpital Jean Minjoz  
Boulevard Fleming  
25030 Besançon cedex

---

(A propos de la communication de P-H CUGNENC et Coll. du 17/12/2003 « Sécurité de l'intervention de Hartmann pour péritonite stercorale généralisée par perforation diverticulaire sigmoïdienne : chute de la mortalité : pas de mortalité au-dessous de 85 ans »)

---

Dans l'étude prospective sur **la mortalité et la morbidité en chirurgie colorectale** qui a servi de base au rapport de l'Association Française de Chirurgie (A.F.C) en octobre 2003, 1421 patients provenant de 81 centres ont pu être analysés. Cent cinq interventions de Hartmann ont été réalisées (7 % des interventions). Quatre vingt douze de ces interventions ont été réalisées en urgence et 54 pour diverticulites compliquées. Dix sept cas correspondaient à une péritonite diffuse purulente (grade 3 de Hinchey) et 13 cas à une péritonite stercorale (grade 4 de Hinchey). Pour ces deux catégories, chez les 24 patients âgés de moins de 85 ans, la mortalité était nulle, elle était de 50 % pour les 6 patients de plus de 85 ans ( $p = 0,005$ ). La morbidité globale était respectivement de 49 % pour les pa-

tients de moins de 85 ans et 66 % pour les patients de plus de 85 ans ( $p$  non significatif). La morbidité chirurgicale était respectivement de 29 % pour les patients de moins de 85 ans et de 0 % pour les patients de plus de 85 ans ( $p$  non significatif). La morbidité chirurgicale nulle pour les patients de plus de 85 ans n'intervenait donc pas dans la mortalité plus grande de ce groupe.

En conclusion : alors que deux des quatre facteurs de mortalité de la chirurgie colorectale retrouvés dans l'étude prospective de l'AFC sont l'intervention en urgence et l'âge supérieur à 70 ans, cette étude confirme que l'intervention de Hartmann pour diverticulite grade Hinchey 3 ou 4 peut correspondre à une mortalité nulle en-dessous de 85 ans.